




กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ป่วย ไข้เลือดออก ก็แพร่โรคได้



เพราะมียุงลายเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก เมื่อไปกัด
ผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสไข้เลือดออก จะสามารถแพร่โรคได้
หากมีอาการป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออกให้รีบพบแพทย์
เพื่อรับการรักษา

ผู้ป่วยที่มีไข้ แดงกลับมารักษา ตัวต่อที่บ้าน ควรทากันยุง เพื่อป้องกันยุงกัด



ป้องกันไม่ให้ยุงกัด เพื่อลดการแพร่ เชื้อไวรัสเลือดออก
ไปยังผู้อื่น



วิธีป้องกัน

1. ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
ควรทายากันยุงอย่างต่อเนื่อง

3. หากในบ้านมีผู้ป่วยไข้เลือดออก
ทุกคนในครอบครัว ควรป้องกัน
ตนเองไม่ให้ถูกยุงลายกัด
เช่น ทายากันยุง



2. นอนในมุ้งและสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด



4. ต้องหมั่นสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย
ทั้งภายในบ้านและรอบบ้าน ทุกสัปดาห์

เพื่อลดการแพร่เชื้อและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก